

34

Y. eks. 7.4.1 s. 442

i. Bagudrettet lign.: $P_t' = G P_t$; $G = \begin{bmatrix} -\lambda & \lambda \\ \mu & -\mu \end{bmatrix}$
 Fremadrettet lign.: $P_t' = P_t G$

ii. $P_t' = P_t G \Leftrightarrow P_t'^T = G^T P_t^T$; $G^T = \begin{bmatrix} -\lambda & \mu \\ \lambda & -\mu \end{bmatrix}$

$$\det(G^T - \alpha I) = \begin{vmatrix} -\lambda - \alpha & \mu \\ \lambda & -\mu - \alpha \end{vmatrix} = \dots = \alpha(\alpha + (\lambda + \mu))$$

$$\alpha = 0 : \begin{bmatrix} -\lambda & \mu \\ \lambda & -\mu \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} \lambda & -\mu \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \bar{v} = r \begin{bmatrix} \mu \\ \lambda \end{bmatrix}, \quad r \neq 0$$

$$\alpha = -(\lambda + \mu) : \begin{bmatrix} \mu & \mu \\ \lambda & \lambda \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \bar{v} = s \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad s \neq 0$$

$$S = \begin{bmatrix} \mu & 1 \\ \lambda & -1 \end{bmatrix}, \quad S^{-1} P_t^T = \begin{bmatrix} c_1 & c_3 \\ c_2 e^{-(\lambda+\mu)t} & c_4 e^{-(\lambda+\mu)t} \end{bmatrix}$$

$$P_t^T = \begin{bmatrix} c_1 \mu + c_2 e^{-(\lambda+\mu)t} & c_3 \mu + c_4 e^{-(\lambda+\mu)t} \\ c_1 \lambda - c_2 e^{-(\lambda+\mu)t} & c_3 \lambda - c_4 e^{-(\lambda+\mu)t} \end{bmatrix}$$


$$P_0^T = I \Rightarrow P_t^T = \frac{1}{\lambda + \mu} \begin{bmatrix} \mu + \lambda e^{-(\lambda+\mu)t} & \mu - \mu e^{-(\lambda+\mu)t} \\ \lambda - \lambda e^{-(\lambda+\mu)t} & \lambda + \mu e^{-(\lambda+\mu)t} \end{bmatrix}$$

$$P_t = \frac{1}{\lambda + \mu} \begin{bmatrix} \mu + \lambda e^{-(\lambda+\mu)t} & \lambda(1 - e^{-(\lambda+\mu)t}) \\ \mu(1 - e^{-(\lambda+\mu)t}) & \lambda + \mu e^{-(\lambda+\mu)t} \end{bmatrix}$$

iii. $P_t \rightarrow \frac{1}{\lambda + \mu} \begin{bmatrix} \mu & \lambda \\ \mu & \lambda \end{bmatrix} \text{ for } t \rightarrow \infty$

35

a



b

$$G = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & -4 \end{bmatrix}$$

$$\left(\Pi = \left(\frac{24}{65}, \frac{24}{65}, \frac{12}{65}, \frac{4}{65}, \frac{1}{65} \right) \right)$$

c

$$E[Y_{(1)}] = \frac{1}{4} \quad (n = 3 + 1 = 4)$$

d

$$\xrightarrow[4]{\quad} \quad P(X < Y_{(1)}) = \frac{1}{1+4} = \frac{1}{5}$$

* 33

i-te tilstand i $\{X_j\}$ absorberende $\Rightarrow V_{ij} = 0$ for alle j
 \Rightarrow i-te række i G er en nulrække

36

Opholdsintensitet i tilst. i : λ_i (forløbig)

Antag, at procesen ved opholdstidens udløb
kan forblive i tilst. i med sands. p_{ii} .

N : antal gange processen successivt befinder sig i
tilst. i , $N \sim g(1-p_{ii})$, $N = 1, 2, \dots$


S_N : samlet opholdstid til tilst. i forlades

$$S_N \sim e(\lambda_i(1-p_{ii})) \text{, jf. opg. } \underline{3.11} \text{ 147 b}$$

Äquivalent model: Sat $\lambda'_i := \lambda_i(1-p_{ii})$, $p_{ii} := 0$ og
(den sejdantige)

$$\mu_{ij} := \frac{p_{ij}}{1-p_{ii}}, j \neq i$$

37 a



$$G = \begin{bmatrix} -a & a & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{a}{2} & -b & \frac{a}{2} & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{a}{2} & -b & \frac{a}{2} & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & \frac{a}{2} & -b & \frac{a}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & \frac{a}{2} & -b & \frac{a}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & a & -a \end{bmatrix}$$

b

$$G^T = \begin{bmatrix} -a & \frac{a}{2} & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 \\ a & -b & \frac{a}{2} & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{a}{2} & -b & \frac{a}{2} & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & \frac{a}{2} & -b & \frac{a}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & \frac{a}{2} & -b & a \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & a & -a \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} -2a & b & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -b & b & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -b & b & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & -b & b & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & -b & 2a \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

fortsættes

37 b fortsat

$$\underline{\pi} = \pi_0 (1, \frac{2a}{b}, \dots, \frac{2a}{b}, 1)$$

$$\sum_i \pi_i = 1 \Rightarrow \pi_0 = \frac{b}{2b + 2a(m-1)}$$

$$\underline{\pi} = \frac{1}{2b + 2a(m-1)} (1, 2a, \dots, 2a, 1)$$

$$b = 2a \Rightarrow \underline{\pi} = \frac{2a}{4a + 2a(m-1)} (1, \dots, 1)$$

$$= \frac{1}{m+1} (1, \dots, 1), \text{ dvs. ligeford.}$$

(Svigt.: $\underline{\pi}$ i opg. 8.3 24 c er ikke ligeford.)

38

$\{X_n\}$ diskret Markovkæde

\underline{v} vektor med ikke-negative komponenter

Når $\underline{v} P = \underline{v}$, kaldes \underline{v} et invariant mål for $\{X_n\}$

a Antag $0 < \sum_j v_j < \infty$, og betragt $\frac{1}{\sum_j v_j} \underline{v}$

$$\frac{1}{\sum_j v_j} \underline{v} P = \frac{1}{\sum_j v_j} \underline{v}, \text{ dvs. } \frac{1}{\sum_j v_j} \underline{v} \text{ er stat. ford.}$$

b $\{X_t\}$ Markovkæde i kont. tid m. indlejret $\{X_n\}$

$$\pi_j = \frac{c v_j}{\lambda_j}, j \in S, \text{ er løsn. til } \underline{\pi} G = 0, \text{ idet}$$

$$\begin{aligned} \forall j: \sum_i Y_{ij} \frac{cv_i}{\lambda_i} &= \sum_{i \neq j} \left(-\frac{Y_{ij}}{Y_{ii}} \right) cv_i = \frac{Y_{jj}}{Y_{ii}} cv_j \\ &= \sum_{i \neq j} \mu_{ij} cv_i - cv_j = cv_j - cv_j \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\sum_j \frac{cv_j}{\lambda_j} = 1 \Rightarrow c = \frac{1}{\sum_j \frac{v_j}{\lambda_j}}$$

c $\{X_n\}$ symmetrisk random walk

$\underline{1} = \underline{1}$ er invariant mål for $\{X_n\}$, idet

$$\underline{1} P = (\dots, \frac{1}{2} + \frac{1}{2}, \dots) = (\dots, 1, \dots) = \underline{1}$$

fortsættes

fortsat

d Opholdsintensiteter for $\{X_t\}$: $\lambda_0 = 1$
 $\lambda_k = k^2, k = \pm 1, \pm 2, \dots$

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{\nu_k}{\lambda_k} = \frac{1}{1} + 2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = 1 + 2 \frac{\pi^2}{6} = \frac{3+\pi^2}{3}$$

Stat. Jord.: $\pi_0 = \frac{3}{3+\pi^2}, \pi_k = \frac{3}{(3+\pi^2)k^2}, k = \pm 1, \pm 2, \dots$

$\{X_n\}$ er neutrakurrent (jf. satz. 8.6 side 466)

$\{X_t\}$ er positiv rekurrent

39 Stat. Jord. for $\{X_n\}$, jf. org. 8.2 16, og denmed
 invariant mäl: $\pi_0 = \frac{1}{3}, \pi_k = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2^{k-1}}, k = 1, 2, \dots$

Betingelse for at $\{X_t\}$ har stat. Jord.: $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\pi_k}{\lambda_k} < \infty$

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\pi_k}{\lambda_k} = \frac{1}{3\lambda_0} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{3} \frac{1}{2^{k-1}} \frac{1}{\lambda_k} = \frac{1}{3\lambda_0} + \frac{2}{3} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k \lambda_k} < \infty$$

$$\lambda_k > \left(\frac{1}{2}\right)^k$$