

# Gruppevirksomheder, Burnside's lemma og konjugeringsklasser.

## Proposition.

1. Stabilisatoren  $G_X$  er en undergruppe af  $G$  for alle  $X \subseteq S$ .
2. Banerne udgør en partition af  $S$ :  
 $x \in Gx$  og hvis  $Gx \cap Gy \neq \emptyset$  så er  $Gx = Gy$ .
3. For  $x \in S$  definerer  $\tilde{f}(gG_x) = gx$  en veldefineret bijektion  
 $\tilde{f} : G/G_x \mapsto Gx$ .

### **Korollar.**

Hvis  $G$  er endelig så er  $|G| = |Gx| \cdot |G_x|$  for ethvert  $x \in S$ .

**Korollar 2.10.7** Lad  $G$  virke på en endelig mængde  $S$ .

Lad  $G \cdot x_1, \dots, G \cdot x_k$  være de forskellige baner af  $S$  med mindst to elementer.

Så er

$$|S| = |S^G| + \sum_{i=1}^k |G/G_{x_i}|,$$

hvor  $S^G$  er mængden af fikspunkter under  $G$ 's virkning, altså baner med ét element.

### **Burnsides lemma.**

Lad en endelig gruppe  $G$  virke på en endelig mængde  $S$ .  
Så kan antallet af baner under  $G$ 's virkning bestemmes som

$$|S/G| = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |S^g|,$$

hvor  $S^g = \{x \in S \mid g \cdot x = x\}$ .

### Eksempel.

$G$  virker på en mængde  $X$  (f.eks. kanterne i en regulær  $n$ -kant).

Lad  $C$  være en mængde af  $k$  farver.

Lad  $S$  være mængden af mulige farvninger  $f : X \mapsto C$ .

(I eksempel 2.10.9 inkluderes kun farvninger med lige mange sorte og hvide elementer i  $S$ .)

$G$  virker på  $S$  ved  $g \cdot f(t) = f(g(t))$ .

Vi kan ikke se forskel på to farvninger  $f_1$  og  $f_2$  hvis der findes  $g \in G$  så  $g \cdot f_1 = f_2$ .

Lad os sige at  $f_1$  og  $f_2$  da er ækvivalente. (Dette giver en ækvivalensrelation.)

Antallet af ikke-ækvivalente farvninger (eller ækvivalensklasser af farvninger) er da lig med antal baner under  $G$ 's virkning på  $S$ , som bestemmes ved hjælp af Burnsid's lemma.

Lad  $g \in G$ .

$g$  som permutation af  $X$  kan skrives produkt af disjunkte cykler  $g = \sigma_1 \sigma_2 \cdots \sigma_r$ , hvor cykler af længde 1 er medtaget.

Hvis  $g \cdot f = f$  hvor  $g \in G, f \in S$ , så tildeler  $f$  samme farve til hvert element i en cykel  $\sigma_i$ . Antal farvninger  $f$  hvor  $g \cdot f = f$  (altså  $f \in S^g$ ) er  $k^r$ , idet hver af de  $r$  cykler uafhængigt af hinanden kan tildeles en af de  $k$  farver (hvor  $r$  afhænger af  $g$ ).

Altså

$$|S/G| = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} k^{\text{antal cykler af } g \text{ som permutation af } X}.$$

**Konjugering.** Lad  $G$  være en gruppe.  
 $G$  virker på  $G$  ved konjugering:  $g \cdot x = gxg^{-1}$ .

En bane under denne virkning:

$$\{gxg^{-1} \mid g \in G\}$$

kaldes en konjugeringsklasse.

Mængden af fikspunkter under  $G$ 's virkning:

$$\{x \in G \mid gxg^{-1} = x, \text{ for alle } g \in G\}$$

kaldes centeret af  $G$  og betegnes  $Z(G)$  (Mængden af elementer der kommuterer med alle andre elementer.)

Stabilisatoren af en undergruppe  $H$  af  $G$ :

$$\{g \in G \mid gHg^{-1} = H\}$$

kaldes normalisatoren af  $H$  i  $G$  og betegnes  $N_G(H)$ .