

## DMat-05

Fra én eller flere mængder,  $A$ ,  $B$  (delmængder af grundmængden  $U$ ), kan vi konstruere nye mængder:

Foreningsmængde:  $A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$

Fællesmængde:  $A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$

$A$  og  $B$  siges at være disjunkte hvis  $A \cap B = \emptyset$ .

Mængdedifferens:  $A - B = \{x \mid x \in A \wedge \neg(x \in B)\}$

Komplementærmængde:  $\bar{A} = \{x \mid \neg(x \in A)\} = U - A$

Symmetrisk differens:  $A \oplus B = \{x \mid (x \in A) \oplus (x \in B)\}$

Udvalgte “regneregler” for disse mængdeoperationer:

$$\begin{array}{ll} A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C) & \text{distributiv lov} \\ A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C) & \text{distributiv lov} \\ \overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B} & \text{de Morgans lov} \\ \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B} & \text{de Morgans lov} \end{array}$$

En funktion  $f : A \mapsto B$  opfylder at for ethvert element  $a$  i mængden  $A$  er der ét element  $f(a)$  i mængden  $B$ .

Egenskab for $f$	for ethvert $b \in B$ findes der
injektiv	højst ét element $a \in A$ så $f(a) = b$
surjektiv	mindst ét element $a \in A$ så $f(a) = b$
bijektiv	præcis ét element $a \in A$ så $f(a) = b$

For et reelt tal  $b > 0$  defineres **eksponentialfunktionen** med **grundtal**  $b$  som en funktion  $f_b : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}^+$ , skrives  $f_b(x) = b^x$ .

Egenskaber:

Hvis  $x$  er et positivt helt tal så er  $b^x = b \cdot b \cdots b$ , hvor der er  $x$  faktorer i produktet.

$$b^{-x} = \frac{1}{b^x}$$

$$b^{x+y} = b^x b^y$$

$$(b^x)^y = b^{xy}.$$

$f_b$  er bijektiv.

Hvis  $b > 1$  så er  $f_b$  voksende. Hvis  $0 < b < 1$  så er  $f_b$  aftagende.

Da  $f_b$  er bijektiv så er der en invers funktion: **logaritmefunktionen** med grundtal  $b$ ,  $\log_b : \mathbb{R}^+ \mapsto \mathbb{R}$ .


$$b^{\log_b x} = x, \log_b b^x = x$$



Egenskaber:

$\log_b(xy) = \log_b x + \log_b y$  for alle positive reelle tal  $x$  og  $y$

$\log_b(x^y) = y \log_b x$  for alle reelle tal  $y$  og positive reelle tal  $x$ .

I DMat er  $\log x = \log_2 x = \frac{\ln x}{\ln 2}$ .





En **følge** af elementer i mængden  $S$  (f.eks.  $S = \mathbb{R}$ ), skrives  $a_0, a_1, a_2, a_3, \dots$ , er en funktion  $a : \mathbb{N} \mapsto S$ .

Eller

$a_1, a_2, a_3, a_4, \dots$ ,

$a_m, a_{m+1}, a_{m+2}, a_{m+3}, \dots$ , hvor  $m$  er et positivt eller negativt heltal.

Eller

$a_m, a_{m+1}, a_{m+2}, \dots, a_{n-1}, a_n$

Fibonacci-tallene  $f_0, f_1, f_2, f_3, \dots$

$0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, \dots$

opfylder at  $f_n = f_{n-2} + f_{n-1}$  for alle  $n \geq 2$ .



For en følge  $\dots, a_m, a_{m+1}, \dots, a_n, \dots$  defineres

$$\sum_{i=m}^n a_i = a_m + a_{m+1} + \dots + a_n.$$

**procedure** *sum*(*m, n*:heltal, *a<sub>m</sub>, ..., a<sub>n</sub>*: tal)

*S* := 0

*i* := *m*

**while** *i* ≤ *n*

**begin**

*S* := *S* + *a<sub>i</sub>*

*i* := *i* + 1

**end**

{ *S* =  $\sum_{i=m}^n a_i$  }

**Eksempel.**  $\sum_{i=1}^n i = 1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ .

**Eksempel.**  $\sum_{i=0}^n ar^i = \frac{ar^{n+1}-a}{r-1}$ , hvis  $r \neq 0$ ,  $r \neq 1$ .