

Matematisk modellering og numeriske metoder

Opgaver til Lektion 12

Morten Grud Rasmussen

20. oktober 2014

Opgave 1

[Bogens opgave 12.6.1]

Hvordan afhænger henfaldshastigheden af $u_n(x, t) = b_n \sin(\frac{n\pi}{L}x)e^{-\lambda_n^2 t}$ for fast n af specifik den varmekapacitet, tætheden og varmeledningsevnen af materialet?

Opgave 2

[Bogens opgave 12.6.4]

Sammenlign varme- og bølgeligningerne mht. opførslen af deres egenfunktioner samt begyndelsesværdi- og randbetingelser.

Opgave 3

[Bogens opgaver 12.6.5 og 12.6.7]

Løs den én-dimensionelle varmeligning på $[0, 10]$ med randbetingelsen $u(0, t) = u(10, t) = 0$, $\rho = 10.6$, $K = 1.04$, $\sigma = 0.056$ og begyndelsesværdibetingelse hhv.

1. $u(x, 0) = 0.1 \sin(\frac{\pi x}{10})$
2. $u(x, 0) = x(10 - x)$

Opgave 4

[Bogens opgaver 12.6.11, 12.6.13 og 12.6.15]

Tjek, at $u(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cos(\frac{n\pi}{L}x)e^{-(\frac{cn\pi}{L})^2 t}$ løser varmeligningen på $[0, L]$ med randbetingelser $u_x(0, t) = u_x(L, t) = 0$ og begyndelsesbetingelse $u(x, 0) = f(x)$, hvor a_n er Fourierkoefficienterne fra den halvsidige cos-udvikling af funktionen f , såfremt det antages, at det er tilladt at differentiere den uendelige sum ledvist.

Find løsningen, når $L = \pi$, $c = 1$ og f er givet ved hhv.

1. $f(x) = 1$
2. $f(x) = 1 - \frac{x}{\pi}$